

# Hebammen- Kompendium

Präparate- und  
Beratungsübersicht



Gesundheit –  
von Anfang an



## InfectoPharm und Pädia – Ihre Partner in der Kindergesundheit

Unser Familienunternehmen InfectoPharm entwickelt seit über 30 Jahren wirksame Arzneimittel für Kinder. Alle zeichnen sich durch mindestens ein besonderes „Kinder-Plus“ aus: schmecken zum Beispiel nach Himbeere oder müssen nur einmal täglich eingenommen werden. Das hilft den kleinen Patienten, unterstützt ihre Eltern und die Fachkreise schätzen es.

Die Tochterfirma Pädia erweitert unsere Produktpalette um besonders verträgliche und sanfte Präparate. Die meisten davon eignen sich daher bereits ab Geburt und alle sind ohne Rezept in der Apotheke erhältlich.

Der Verbund erst macht uns stark und unverwechselbar. Diese Erfahrung tragen wir an unsere Partner, die Fachkreise in der Praxis, heran. Besonders Hebammen möchten wir mit unserem kostenfreien Muster-, Abo-, Service- und Fortbildungsangebot unterstützen. Gewinnen Sie in dieser Broschüre einen schnellen Überblick über unsere OTC-Präparate für Säuglinge, Kleinkinder und Stillende.

Ihre InfectoPharm und Pädia

# Inhalt

## ERKÄLTUNG

Atemwegsbeschwerden .....	S. 6
Fieber und Schmerzen.....	S. 7
Reizhusten.....	S. 8-9

## GESICHT UND MUND

Zahnungsschmerzen und Aphthen.....	S. 10
Mundsoor .....	S. 11
Lippenherpes .....	S. 12-13

## HAUT

Abszesse .....	S. 14
Dellwarzen und Hautwarzen .....	S. 15-16
Milchschorf und Kopfgneis.....	S. 17
Neurodermitis .....	S. 18-23
Windelsoor und Hautcandidosen .....	S. 24
Windpocken und Gürtelrose .....	S. 25
Schmerzen beim Impfen .....	S. 26

## MAGEN-DARM

Darmaufbau .....	S. 27
Durchfall.....	S. 28-29
Unterstützung des Immunsystems.....	S. 30
Magen-Darm.....	S. 31-32
Kümmelzäpfchen .....	S. 33
Reiseübelkeit .....	S.34
Verstopfung .....	S. 35-36

## MAMA

Glucosetoleranztest.....	S. 37
Stillprobleme.....	S. 38-40

## PARASITEN

Kopflausbefall.....	S. 41-42
Madenwurmbefall.....	S. 43

## VITAMINE

Vitamin-D-Prophylaxe und -Mangel.....	S. 44
Vitamin-K-Prophylaxe und -Mangel.....	S. 45

## SERVICEMATERIAL

Literatur.....	S. 46-47
Pflichtangaben.....	S. 48-51
Patientenratgeber.....	S. 52
Servicematerial für Schwangere und Babys.....	S. 53
Servicematerial für die Hebamme.....	S. 54-55
Themenhefte.....	S. 56-57

# Kochsalz 0,9 %

## Inhalat Pädia

Isotone Kochsalzlösung

Befreit sanft Nase  
und Atemwege



### Besonders geeignet:

- Als inhalative Begleitmaßnahme bei Husten, Schnupfen und grippalem Infekt
- Bei trockenen Atemwegen und Nasenschleimhäuten
- Zum Eintropfen in die Nase und für elektrische Vernebler

### Wichtig für die Beratung:

- Unterstützt die natürliche Reinigung der Atemwege
- Wird als besonders wohltuend und lindernd empfunden
- Als Trägerlösung für viele Wirkstoffe erstattungsfähig

 <b>Ampullen</b>	<b>Aussehen</b>	klare Flüssigkeit
	<b>Haltbarkeit</b>	angebrochene Ampullen verwerfen
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	geeignet
	<b>Dosierung</b>	nach Bedarf bis zu 4x tägl. 1 Ampulle unverdünnt inhalieren, zur Nasenhygiene 1-3 mal täglich in jedes Nasenloch
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	20 Stück à 2,5 ml (14293649), 60 Stück à 2,5 ml (14293655)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig als Trägerlösung für viele Wirkstoffe

# Ibuprofen Pädia®

## 75/150 mg Zäpfchen

Im richtigen  
Moment mitfiebern



**Besonders geeignet:**

- Bei Fieber, Schmerzen und Entzündungen
- In der Wirkstärke 75 mg bereits für Säuglinge ab 8 Monaten geeignet
- In der Wirkstärke 150 mg für Kinder ab 3 Jahren

**Wichtig für die Beratung:**

- Vielseitig anwendbar dank antipyretischer, analgetischer und antiinflammatorischer Wirkung
- Schneller fiebersenkend und höhere therapeutische Breite als Paracetamol<sup>1</sup>
- Zwischen den Einzelgaben sollten mind. 6 h Abstand gelassen werden

 <b>Lösung</b>	<b>Aussehen</b>	weiße Zäpfchen
	<b>Haltbarkeit</b>	5 Jahre
	<b>Alter</b>	75 mg ab 8 Monaten (7,5 kg KG) bis 2 Jahre (12 kg KG); 150 mg ab 3 Jahren (15 kg KG) bis 9 Jahre (29 kg KG)
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	Im 1. und 2. Schwangerschaftstrimenon Anwendung nur, wenn dies unbedingt notwendig ist. Im 3. Trimenon darf Ibuprofen Pädia nicht angewendet werden. In der Stillzeit ist bei kurzfristiger Anwendung eine Stillunterbrechung in der Regel nicht erforderlich.
	<b>Dosierung</b>	Einzel dosis: 1 Zäpfchen; max. Tagesdosis: 3-4 Zäpfchen je nach Alter bzw. Gewicht des Kindes
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	75 mg 10 St. (18157334), 150 mg 10 St. (18157340)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# Quimbo® Sirup

Levodropropizin

Husten?  
Reizt mich nicht.



**Besonders geeignet:**

- Zur symptomatischen Therapie des Reizhustens
- Für Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene
- Um die Hustenfrequenz zu senken für einen erholsamen Nachtschlaf

**Wichtig für die Beratung:**

- Sehr gut verträglich durch periphere Wirkung an den Hustenrezeptoren der Atemwege ohne zentral dämpfende Effekte<sup>2,3</sup>
- Wirksam ab dem 1. Tag, keine bekannten Wechselwirkungen<sup>4,5</sup>
- Alkoholfrei und mit angenehmem Kirscheschmack

 Lösung	<b>Aussehen</b>	braune Glasflasche, versehen mit einem kindersicheren Kunststoff-Verschluss
	<b>Haltbarkeit</b>	nach Anbruch 24 Monate
	<b>Alter</b>	ab 2 Jahren
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	Quimbo darf in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden
	<b>Dosierung</b>	2-12 Jahre: Dosierung nach Gewicht (s. Beipackzettel), ab 12 Jahren: 10 ml bis zu 3x täglich
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	100 ml (09436070)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# Quimbo<sup>®</sup> Tropfen

Levodropropizin

Husten?  
Reizt mich nicht.



## Besonders geeignet:

- Zur symptomatischen Therapie des Reizhustens
- Für Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene
- Um die Hustenfrequenz zu senken für einen erholsamen Nachtschlaf

## Wichtig für die Beratung:

- Sehr gut verträglich durch periphere Wirkung an den Hustenrezeptoren der Atemwege ohne zentral dämpfende Effekte <sup>2,3</sup>
- Wirksam ab dem 1. Tag, keine bekannten Wechselwirkungen <sup>4,5</sup>
- Alkohol- und zuckerfrei, angenehmer Waldfruchtgeschmack
- Tropfen in einem halben Glas Wasser auflösen

 Lösung	<b>Aussehen</b>	weiße Kunststoffflasche, versehen mit Tropfenzähler und kindersicherem Verschluss
	<b>Haltbarkeit</b>	nach Anbruch 6 Monate
	<b>Alter</b>	ab 2 Jahren
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	Quimbo darf in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden
	<b>Dosierung</b>	2–12 Jahre: Dosierung nach Gewicht (s. Beipackzettel), ab 12 Jahren: 20 Tropfen bis zu 3x täglich
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	30 ml (02654585)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# INFECTO GINGI<sup>®</sup> Mundgel

Lidocain 1,0 g/100 g, Auszug aus Salbeiblättern und Kamillenblüten

3-fach wirksam bei  
Entzündungen im Mund



Weitere Informationen unter  
[www.infectogingi.de](http://www.infectogingi.de)

**Besonders geeignet:**

- Bei Verletzungen und Entzündungen der Mundschleimhaut oder des Zahnfleisches
- Bei Stomatitis aphthosa und Hand-Fuß-Mund-Krankheit
- Bei Aphthen oder Zahnungsbeschwerden

**Wichtig für die Beratung:**

- Wirkt 3-fach: Lidocain – lindert schnell den quälenden Schmerz  
Salbei – desinfiziert und verringert die mikrobielle Besiedlung  
Kamille – wirkt der Entzündung entgegen und fördert die Wundheilung
- Haftet hervorragend auf der Mundschleimhaut
- Anwendung bereits ab Geburt möglich

	<b>Aussehen</b>	grünes Gel
	<b>Haltbarkeit</b>	18 Monate, nach Anbruch 3 Monate
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	Die Anwendung in der Schwangerschaft wird nicht empfohlen. In der Stillzeit sollte es nicht angewendet werden.
	<b>Dosierung</b>	3-4 x täglich eine erbsengroße Menge auftragen
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	6 g (06819037), 20 g (06819043)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# INFECTOSOOR<sup>®</sup> Mundgel

Miconazol 2 %

Von der Fachgesellschaft  
DGPI bei Mundsoor  
empfohlen<sup>5</sup>



## Besonders geeignet:

- Zur Therapie des Mundsoors
- Für Säuglinge und Kleinkinder
- Für Patienten unter Therapie mit inhalativen Steroiden

## Wichtig für die Beratung:

- InfectoSoor Mundgel befreit von Candidosen im Mundraum
- Wirkt schnell und nachhaltig – in Studien belegt<sup>6,7</sup>
- Sehr geringe Resorption von Miconazol bei topischer Applikation

 Gel	<b>Aussehen</b>	weißliches Gel
	<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre; nach Anbruch 8 Wochen
	<b>Alter</b>	ab dem 5. Lebensmonat
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	Sollte nicht in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft angewendet werden. Ab dem 4. Monat der Schwangerschaft nur auf ausdrückliche Anweisung des Arztes. Es ist nicht bekannt, ob der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht. Während der Stillzeit nur auf ausdrückliche Anweisung des Arztes anwenden.
	<b>Dosierung</b>	4-24 Monate: 1 ml Gel 4x täglich nach den Mahlzeiten ab 2 Jahre: 2 ml Gel 4x täglich nach den Mahlzeiten
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	20 g (07200765), 40 g (07200771)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre und >12 Jahre unter spez. Verordnungsbestimmungen

# LOMAHERPAN<sup>®</sup>

Melissenblätter-Trockenextrakt

Mit Melisse bei  
Lippenherpes



Weitere Informationen unter  
[www.lomaherpan.de](http://www.lomaherpan.de)



## Besonders geeignet:

- Zur Lippenpflege bei Lippenherpes
- Auch bei Kindern ab drei Jahren sowie Schwangeren und Stillenden
- Zum Schutz herpesgestresster Lippen

## Wichtig für die Beratung:

- Mit hochkonzentriertem Melissenextrakt
- Sofort beim ersten Kribbeln auftragen
- Reduziert die sichtbaren Zeichen des Lippenherpes wie Rötung und Schwellung<sup>8,9</sup>

 Creme	<b>Aussehen</b>	leicht bräunliche Creme
	<b>Haltbarkeit</b>	bis Mindesthaltbarkeitsdatum; nach Anbruch 6 Monate
	<b>Alter</b>	ab 3 Jahre
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	ja
	<b>Dosierung</b>	2-4x täglich
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	5 ml (16738877)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# LOMA PROTECT®

Melissenextrakt und Lichtschutzfaktor 30

Richtige Pflege für optimalen Lippenschutz



## Besonders geeignet:

- Zur täglichen Lippenpflege
- Zum Schutz der Lippen vor starker UV-Strahlung
- Als zuverlässiger Begleiter im Sommer und im Winter

## Wichtig für die Beratung:

- Lippenpflege mit Melissenextrakt und wertvollen pflanzlichen Ölen
- Mit Lichtschutzfaktor 30 und UVA-Schutz, da insbesondere UV-Strahlung einen Herpesausbruch auslösen kann
- Bestens geeignet für die optimale Pflege vor und nach der Bläschenzeit

 Pflegestift	<b>Aussehen</b>	ockerfarbener Lippenpflegestift, farblos auf den Lippen
	<b>Haltbarkeit</b>	bis Mindesthaltbarkeitsdatum (siehe Stiftboden)
	<b>Alter</b>	ohne Altersbegrenzung
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	ja
	<b>Dosierung</b>	mehrmals täglich
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	1 Stück (04439684)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# ZUGSALBE effect

Ammoniumbituminosulfonat 20 % / 50 %

Natürlich. Schwarz.  
Effektiv bei Abszessen



## Besonders geeignet:

- Zugsalbe effect 20 %: Bei oberflächlichen Abszessen, Rasierpickeln, eingewachsenen Haaren und Nagelbettentzündungen
- Zugsalbe effect 50 %: Bei tiefer liegenden Abszessen wie z. B. Furunkeln, Karbunkeln, Furunkulosen

## Wichtig für die Beratung:

- Wirkt antibakteriell<sup>9</sup> und entzündungshemmend<sup>10</sup>
- Fördert die Reifung des Abszesses und reduziert das unangenehme Druckgefühl
- Je tiefer die Entzündung reicht, desto höher sollte die Konzentration der Zugsalbe gewählt werden

 Salbe	<b>Aussehen</b>	schwarze Salbe
	<b>Haltbarkeit</b>	nach Anbruch 1 Jahr
	<b>Alter</b>	keine Altersbegrenzung
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	nein
	<b>Dosierung</b>	dick auftragen, mit Pflaster/Verband abdecken, täglich Verbandswechsel, maximal 3-5 Tage anwenden
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	20 %: 15g (11517516); 50 %: 15 g (11517539), 40 g (11517545)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# INFECTO DELL®

Kaliumhydroxid 5 %

## Die Lösung bei Dellwarzen



Weitere Informationen unter  
[www.dellwarzen.info](http://www.dellwarzen.info)



### Besonders geeignet:

- Bei einzelnen und multiplen Dellwarzen
- Bei Neurodermitis-Patienten mit Dellwarzen

### Wichtig für die Beratung:

- Dellwarzen schnell und eigenständig therapieren
- Erspart Kindern invasive Therapieformen (Kürettage)
- Studien zeigen: Mit InfectoDell behandelte Dellwarzen kommen nicht wieder<sup>11-13</sup>
- Bei Entzündungsanzeichen Therapie beenden
- Maximal 14 Tage anwenden

 <b>topische Lösung</b>	<b>Aussehen</b>	farblose Lösung
	<b>Haltbarkeit</b>	nach Anbruch 4 Monate
	<b>Alter</b>	ab 2 Jahren
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	ja
	<b>Dosierung</b>	2x täglich sehr sparsam auftragen
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	2 ml (02156605)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# VERRUCID® Lösung

Salicylsäure 10 %

Hex-Hex, Warze weg!

## Besonders geeignet:

- Als Schälmittel bei Hyperkeratosen
- Bei Warzen, Hühneraugen oder Hornschwielen
- Mittel der Wahl bei Hautwarzen<sup>14</sup>



## Wichtig für die Beratung:

- Einzigartig durch 4-fach Hilfsstoffkombination:
  - Essigsäure: wirkt zusätzlich leicht ätzend
  - Docusat-Natrium: das Netzmittel fördert das Eindringen der Verrucid-Lösung in die Warze
  - Rizinusöl: verhindert ein zu starkes Austrocknen
  - Pyroxilin: bildet einen weißen Schutzfilm auf der Warze
- Sehr gut verträglich – Anwendung bereits ab 1 Jahr<sup>15</sup>
- Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre

 topische Lösung	<b>Aussehen</b>	farblose Lösung
	<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre, nach Anbruch 6 Wochen
	<b>Alter</b>	ab 1 Jahr
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	ja, aber nur an einer Fläche < 5 cm <sup>2</sup> und nicht im Brustbereich.
	<b>Dosierung</b>	2 x täglich auftragen, max. 1 ml pro Tag
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	10 ml (03181479)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# BabyBene® Gel

Wertvolles Oliven- und Jojobaöl

Sanfte Schuppenentfernung  
bei Milchschorf und  
Kopfgneis



Besonders geeignet:

- Bei Milchschorf und Kopfgneis
- Bei Schuppenflechten
- Bei Seborrhoischem Ekzem

Weitere Informationen unter  
[www.babybene.de](http://www.babybene.de)



Wichtig für die Beratung:

- Einfache und schnelle Anwendung ohne Rückstände
- Pflegt natürlich sanft
- Bei hartnäckigen Schuppen – Anwendung an den folgenden Tagen wiederholen
- Studie bestätigt: 100%iger Anwendungserfolg<sup>16</sup>

 <b>Oleogel</b>	<b>Aussehen</b>	Oleogel mit weißlich-trüber Färbung
	<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate, bis Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums
	<b>Alter</b>	ab der dritten Lebenswoche
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	ja
	<b>Dosierung</b>	auf der betroffenen Fläche verteilen; ca. 30 Minuten einwirken lassen; tropfenweise Wasser auftragen; verteilen und mit warmem Wasser abspülen
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	10 ml (10033420)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# NEURODERM®

Die Basistherapie, die sich jeder leisten kann



## Besonders geeignet:

- Zur Basispflege der trockenen Haut, z. B. bei Neurodermitis

Weitere Informationen unter [www.neuroderm.de](http://www.neuroderm.de)



## Wichtig für die Beratung:

- 20% Glycerin statt Urea (da Urea auf der Haut „brennen“ kann)
- Unterschiedlicher Lipidgehalt für jede Haut und Jahreszeit
- Frei von Wollwachs, Farb- und Duftstoffen
- Besonders preisgünstig

 Creme	<b>Aussehen</b>	weiße Creme; weiße, leicht flüssige Lotion (PflegeLotion)
	<b>Haltbarkeit</b>	2 Jahre, nach Anbruch 3 Monate
	<b>Alter</b>	ab Geburt, nicht bei Frühgeborenen
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	keine Einschränkung bekannt
	<b>Dosierung</b>	2–6 x täglich dünn auftragen
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	Pflegelotion: 100 ml (14058026), 250 ml (14058032), 500 ml (14058049) Pflegecreme: 100 ml (14057972), 250 ml (14057989) Pflegecreme Lipo: 100 ml (14057995), 250 ml (14058003)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# NEURODERM<sup>®</sup>

## PflegeLotion

W/O-Emulsion, 25 % Lipide, 20 % Glycerin

- Lotion mit Avocadoöl

### Empfohlene Anwendung:

- Für leicht trockene bis trockene Haut
- Besonders geeignet für die Sommermonate



# NEURODERM<sup>®</sup>

## Pflegecreme

W/O-Emulsion, 30 % Lipide, 20 % Glycerin

- Creme als Rezepturgrundlage geeignet

### Empfohlene Anwendung:

- Für trockene Haut
- Zu jeder Jahreszeit einsetzbar



# NEURODERM<sup>®</sup>

## Pflegecreme Lipo

W/O-Emulsion, 50 % Lipide, 20 % Glycerin

- Reichhaltige Lipolotion mit Mandelöl

### Empfohlene Anwendung:

- Für sehr trockene Haut
- Bevorzugt in den Wintermonaten



# Die optimale Ergänzung zur Basispflege

## NEURODERM®

### Mandelölbad

Mandelöl

Pflegt und hilft  
bei Neurodermitis



**Besonders geeignet:**

- Bei Neurodermitis, Psoriasis, Ichthyosis, trockener Altershaut, Windeleczem, Waschkezem

**Wichtig für die Beratung:**

- Spreitendes Ölbad: Beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne zieht sich ein schützender Film aus Mandelöl über die Haut
- Nur spreitende Ölbad er verhindern den Feuchtigkeitsverlust und geben der Haut Fette zurück<sup>17</sup>
- Sehr gut verträglich dank hoch gereinigtem Mandelöl (auch für Nuss-Allergiker geeignet)
- Frei von Detergenzien und Konservierungsstoffen
- Auch unverdünnt als Pflegeöl anwendbar

 <b>Öl</b>	<b>Aussehen</b>	farbloses Öl
	<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre, nach Anbruch 6 Monate
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	keine Einschränkung bekannt
	<b>Dosierung</b>	2-3 x pro Woche, 15-30 ml pro Vollbad
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	200 ml (06705919), 500 ml (06704788)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

## NEURODERM®

### Repair

Glycerin und Ceramide

Regenerierende  
Intensivcreme für trockene  
und juckende Hautstellen



### Besonders geeignet:

- Zur Intensivpflege von trockener und juckender Haut, wie z.B. bei Neurodermitis

### Wichtig für die Beratung:

- Die Ceramid-Creme hilft, den Juckreiz rasch und effektiv zu lindern
- Die Zusammensetzung im physiologischen Verhältnis 3:1:1 (Ceramide, Cholesterol, freie Fettsäuren) ist den Hautbausteinen nachempfunden. Diese unterstützen die Regeneration der Hautbarriere und helfen sie zu stabilisieren.
- 20 % Glycerin sorgt für eine intensive Rückfeuchtung der Haut
- Insbesondere Kinder akzeptieren die Creme besser, da Glycerin nicht „brennt“ wie Harnstoff
- Bereits für die empfindliche Säuglingshaut geeignet, ohne Duft- und Farbstoffe

 Salbe	<b>Aussehen</b>	weiße Creme
	<b>Haltbarkeit</b>	2 Jahre, nach Anbruch 3 Monate
	<b>Alter</b>	ab Geburt, nicht bei Frühgeborenen
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	keine Einschränkung bekannt
	<b>Dosierung</b>	bei Bedarf auf beanspruchte Hautbereiche dünn auftragen
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	25 ml (14058055), 50 ml (14058061)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# SanaCutan<sup>®</sup> Basiscreme

O/W-Emulsion, 30% Lipide, 20% Glycerin

Ideale Basistherapie  
mit 20% Glycerin bei  
Neurodermitis



## Besonders geeignet:

- Zur Basistherapie bei Neurodermitis
- Zur Behandlung von Ekzemen und Hautentzündungen

## Wichtig für die Beratung:

- Der natürliche Feuchthaltefaktor Glycerin sorgt für eine intensive Hydratisierung der trockenen Haut
- O/W-Emulsion mit 30% Lipidanteil, lässt sich sehr gut verstreichen und zieht schnell ein
- Hervorragende Verträglichkeit, bereits für die empfindliche Säuglingshaut geeignet
- Frei von Wollwachs (Lanolin), Farb- und Duftstoffen
- Optimale Rezepturgrundlage

 Creme	<b>Aussehen</b>	weiße Creme
	<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre, nach Anbruch 3 Monate
	<b>Alter</b>	ab Säuglingsalter
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	keine Einschränkung
	<b>Dosierung</b>	1-3 x täglich auftragen und leicht einreiben
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	50 g (13346763), 150 g (12447798)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# SanaCutan® Basissalbe

Fettsalbe, 100% Lipide

Die Basissalbe bei  
chronischen Hautentzündungen



Besonders geeignet:

- Zur unterstützenden Behandlung von Ekzemen, Hautentzündungen und Psoriasis, insbesondere bei trockener Haut

Wichtig für die Beratung:

- Salbe auf Paraffin- / Vaseline-Basis, ohne Wasserzusatz
- Frei von Wollwachs (Lanolin), Farb- und Duftstoffen
- Optimale Rezepturgrundlage

 Salbe	<b>Aussehen</b>	nahezu weiße, durchscheinende Salbe
	<b>Haltbarkeit</b>	5 Jahre, nach Anbruch 3 Monate
	<b>Alter</b>	ab Säuglingsalter
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	keine Einschränkung
	<b>Dosierung</b>	1-3 x täglich auftragen und leicht einreiben
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	50 g (12447806), 150 g (12447812)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# INFECTOSOOR<sup>®</sup> Zinksalbe

Miconazol 0,25 % und Zinkoxid 15 %

Bewährte Kombination  
bei Candidosen  
der Haut<sup>5</sup>



## Besonders geeignet:

- Zur Therapie bei Windelsoor und Hautcandidosen
- Für Säuglinge und Kleinkinder
- Für Sportler – bei durch Candida verursachter Infektion von durch Reibung verursachten Hautentzündungen
- Bei Candida-Infektion durch Bettlägerigkeit, Adipositas, Diabetes etc., z.B. bei Senioren

## Wichtig für die Beratung:

- InfectoSoor Zinksalbe bekämpft zuverlässig Candidosen auf der Haut
- Wirkt schnell und nachhaltig – in Studien belegt<sup>18</sup>
- Wirkt stark antiphlogistisch – spart Kortikosteroide<sup>19</sup>

	<b>Aussehen</b>	weiße Salbe
	<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre; nach Anbruch bis Verfallsdatum
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	in der Stillzeit nicht im Brustbereich anwenden
	<b>Dosierung</b>	siehe Fachinformation oder Beipackzettel
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	15 g (08497856), 30 g (08497862), 60 g (08862066)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# Anaesthesulf<sup>®</sup> Lotio

Polidocanol in Zinkoxidschüttelmixtur



## 3-fach stark gegen Juckreiz

### Besonders geeignet:

- Bei juckenden Dermatosen
- Bei Säuglingen und Kindern mit Windpocken
- Zur Juckreizlinderung bei Gürtelrose

### Wichtig für die Beratung:

- 3-fach-Kombination:
  - Die Schüttelmixtur kühlt angenehm
  - Lauromacrogol (= Polidocanol) lindert den quälenden Juckreiz
  - Zinkoxid trocknet juckende Bläschen aus
- Seit Jahrzehnten erfolgreich und beliebt: bei Jung und Alt
- Bereits ab Geburt zugelassen

 Lotion	<b>Aussehen</b>	milchig-weiße Suspension
	<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre; nach Anbruch 3 Monate
	<b>Alter</b>	ab Geburt, nicht bei Frühgeborenen
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	nicht großflächig, in der Stillzeit nicht auf die Brust auftragen, max. 14 Tage
	<b>Dosierung</b>	1–3x täglich dünn auftragen für max. 7 Tage
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	50 g (00123435), 100 g (00123441)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# Tapfi®

25 mg/ 25 mg Lidocain und Prilocain

Tapfi lässt mich  
nicht im Stich



## Besonders geeignet:

- Für schmerz- und stressarmes Impfen bei Säuglingen und Kindern
- Auch für Jugendliche und Erwachsene mit Nadelphobie
- Zur Betäubung der Haut vor:
  - einem Nadeleinstich z.B. bei Blutabnahmen oder Kanülierung
  - kleineren operativen Eingriffen an der Haut z.B. Warzenentfernung

## Wichtig für die Beratung:

- Das Pflaster sollte mind. 1 h vor der Impfung/ dem Eingriff aufgebracht werden
- Anwendung bereits ab Geburt möglich
- Nimmt die Angst und fördert die Compliance bei Impfungen

 <b>Pflaster</b>	<b>Aussehen</b>	wirkstoffhaltiges Pflaster
	<b>Haltbarkeit</b>	bis Verfalldatum
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	Die Anwendung in der Schwangerschaft sollte mit Vorsicht erfolgen, da nur unzureichende Daten vorliegen. Tapfi kann während der Stillzeit angewendet werden, wenn ein klinischer Bedarf besteht.
	<b>Dosierung</b>	Einwirkzeiten Pflaster: 0-11 Monate max. 1 h; ab 1 Jahr mind. 1 h – max. 5 h. Zur Anwendung von mehreren Pflastern siehe Fachinformation.
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	2 Stück (16739747), 20 Stück (16739776)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# LGG®

*Lactobacillus rhamnosus GG®\**

Gezielt mit *Lactobacillus GG®*  
versorgen



## Besonders geeignet:

- Zur Stärkung der Darmflora
- Zur Unterstützung der Peristaltik des Darms

## Wichtig für die Beratung:

- Ab Geburt geeignet
- Kapseln können geöffnet und deren Inhalt in kühles bis handwarmes Wasser eingerührt werden

\*LGG® ist eine lizenzierte Marke von Chr. Hansen.

 Hartkapseln	<b>Aussehen</b>	HPMC-Kapseln mit weißlich/gelblichem Pulver (können geöffnet werden)
	<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre; nach Anbruch 1 Monat
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	ja
	<b>Dosierung</b>	2 x täglich 1 Kapsel für mind. 4 Wochen
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	30 Kapseln (01746641), 60 Kapseln (01746658)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# INFECTODIARRSTOP® LGG®

Mono Beutel

*Lactobacillus rhamnosus GG\**

Schnelle Hilfe –  
schon für die Kleinsten



## Besonders geeignet:

- Für Säuglinge und Kleinkinder ergänzend zur oralen Rehydratation
- Für die Unterstützung der Darmflora bei Durchfall

## Wichtig für die Beratung:

- Schnell wirksam und hervorragend verträglich
- Fachgesellschaften empfehlen LGG bei kindlichem Durchfall<sup>20,21</sup>
- Fördert die Heilung und reduziert die Durchfalldauer

\*LGG® ist eine lizenzierte Marke von Chr. Hansen.

 Suspension	<b>Aussehen</b>	weiß-gelbliches Pulver; nach Zubereitung: leicht trübe Suspension
	<b>Haltbarkeit</b>	2 Jahre, 24 Stunden im Kühlschrank nach Lösung des Pulvers
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	keine Einschränkung
	<b>Dosierung</b>	2x täglich 1 Beutel
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	10 Beutel (06872385)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# INFECTODIARRSTOP<sup>®</sup> LGG<sup>®</sup>

Orale Rehydratation + *Lactobacillus rhamnosus* GG<sup>\*</sup>

Schnelle Hilfe  
gegen Durchfall



Besonders geeignet:

- Bei Diarrhoe, vor allem für Säuglinge und Kleinkinder

Wichtig für die Beratung:

- Schnell wirksam und hervorragend verträglich
- Fachgesellschaften empfehlen LGG bei kindlichem Durchfall<sup>20,21</sup>
- Fördert die Heilung und reduziert die Durchfalldauer

<sup>\*</sup>LGG<sup>®</sup> ist eine lizenzierte Marke von Chr. Hansen.

 Suspension	<b>Aussehen</b>	weiß-gelbliches Pulver; nach Zubereitung: leicht trübe Suspension
	<b>Haltbarkeit</b>	2 Jahre, 24 Stunden im Kühlschrank nach Lösung des Pulvers
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	keine Einschränkung
	<b>Dosierung</b>	Richtet sich nach dem Schweregrad der Erkrankung, siehe Fachinformation oder Beipackzettel
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	Geschmacksneutral 6 Stück (03436726)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# BiGaia® + Vit. D<sub>3</sub>

Vitamin D<sub>3</sub> und *L. reuteri* DSM 17938

2-fach gut – Vitamin D  
und Lactobacillen



## Besonders geeignet:

- Zur Vitamin-D-Prophylaxe und bei leichtem Vitamin-D-Mangel
- Zur Unterstützung der normalen Funktion des Immunsystems

## Wichtig für die Beratung:

- 400 I.E. Vitamin D pro 5 Tropfen für eine normale Entwicklung von Knochen, Zähnen und Immunsystem
- Keine Beeinflussung des Stillens
- *L. reuteri* stabilisiert nachhaltig Darmflora und Verdauung

 <b>Tropfen</b>	<b>Aussehen</b>	ölige Suspension
	<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate, nach Anbruch 3 Monate (bei 25 °C)
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	geeignet
	<b>Dosierung</b>	altersunabhängig 1x täglich 5 Tropfen (in einem Löffel Milch)
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	10 ml (10270479)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# BiGaia®

*L. reuteri* DSM 17938

*Lactobacillus reuteri* seit  
über 10 Jahren bewährt.



## Besonders geeignet:

- Zur Unterstützung der Darmflora, z. B. nach Kaiserschnitt
- Bei unausgewogener Darmflora, z. B. bedingt durch Antibiotika

## Wichtig für die Beratung:

- Ab Geburt geeignet
- Hohe Sicherheit auch bei Frühgeborenen
- Unterstützt nachhaltig Darmflora und Verdauung
- Ursprünglich aus der Muttermilch gewonnen

 Tropfen	<b>Aussehen</b>	ölige Suspension
	<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate, nach Anbruch 3 Monate (bei 25 °C)
	<b>Alter</b>	ab Geburt, auch bei Frühgeborenen
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	geeignet
	<b>Dosierung</b>	altersunabhängig 1x täglich 5 Tropfen (in einem Löffel Milch)
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	5 ml (03734599), 10 ml (09335452)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# BiGaia® Kautabletten

*L. reuteri* DSM 17938

Für ein Lächeln  
im Bauch



## Besonders geeignet:

- Zur Unterstützung der natürlichen Balance der Darmflora
- Bei unausgewogener Darmflora, z. B. bedingt durch Antibiotika

## Wichtig für die Beratung:

- Unterstützt nachhaltig Darmflora und Verdauung
- Stimuliert den Darm zu einer gleichmäßigen und normalen Peristaltik
- Natürliches Reuterin aus *L.reuteri* kann pathogene Keime bekämpfen
- Mit angenehmem Erdbeergeschmack

 <b>Kautablette</b>	<b>Aussehen</b>	weißliche Kautablette, leicht grobe Struktur beim Zerkauen
	<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate
	<b>Alter</b>	ab Kaulalter
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	geeignet
	<b>Dosierung</b>	1 Kautablette täglich zu einer Mahlzeit
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	30 Stück (12652015)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# Carum Carvi

## Baby-Kümmelzäpfchen

Auszug aus Kümmel\*

Die reine Kraft  
des Kümmels



**Besonders geeignet:**

- Bei Wunsch nach reinen Kümmelzäpfchen

**Wichtig für die Beratung:**

- Ohne weitere Wirk- und Hilfsstoffe
- Ab Geburt zugelassen (kein Teilen der Zäpfchen notwendig)
- Homöopathisches Arzneimittel

\*[Carum carvi, ethanol. Decoctum Ø (Urtinktur (=D1))]

 <b>Zäpfchen</b>	<b>Aussehen</b>	cremefarbene bis gelbliche Zäpfchen
	<b>Haltbarkeit</b>	bis Verfalldatum
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	keine Erfahrungen
	<b>Dosierung</b>	1-2 mal täglich 1 Zäpfchen in den After einführen
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	10 Zäpfchen (13229431)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bei Säuglingen

# VomiSoft®

Dimenhydrinat 24 mg

Gar nicht übel –  
sicher und praktisch



## Besonders geeignet:

- Für Kinder von 2–12 Jahren bei Reiseübelkeit
- Praktisch für unterwegs

## Wichtig für die Beratung:

- Kleinvolumige Fläschchen (6 ml) – sicher und individuell dosierbar
- Mit angenehmem Erdbeergeschmack
- Gluten- und laktosefrei, vegan
- Weniger Verwurf - i. d. R. Anbruch nur eines Fläschchens pro Fahrt

 Lösung	<b>Aussehen</b>	klare rote Lösung
	<b>Haltbarkeit</b>	angebrochene Fläschchen verwerfen
	<b>Alter</b>	ab 2 Jahren (unter 3 Jahren nur nach strenger Indikationsstellung)
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	nur nach ärztl. Rücksprache (ausschließlich für Kinder bestimmt)
	<b>Dosierung</b>	nach Gewicht bzw. Alter, siehe Beipackzettel
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	5 x 6 ml (16837680)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	für Kinder von 2–12 Jahren

# BABYLAX<sup>®</sup>

Glycerol 85 %

Endlich Erleichterung –  
bei akuter Verstopfung



## Besonders geeignet:

- Für Säuglinge oder Kinder
- Wenn eine schnelle und planbare Wirkung angestrebt wird
- Bei Wunsch nach günstiger Therapie

## Wichtig für die Beratung:

- Löst den natürlichen Reflex der Darmentleerung aus
- Wasser- und Elektrolythaushalt bleiben unbeeinflusst
- Abgerundeter Klistierhals ermöglicht die sichere Anwendung bereits bei Säuglingen

 Klistier	<b>Aussehen</b>	dickflüssige, klare viskose Lösung
	<b>Haltbarkeit</b>	2 Jahre
	<b>Alter</b>	für Säuglinge und Kinder (nicht für Neugeborene <28 Tage)
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	Berichte über eine schädliche Wirkung sind nicht bekannt
	<b>Dosierung</b>	Säuglinge: ½ Klistier, Kleinkinder: 1 Klistier, Schulkinder: 1–2 Klistiere
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	3 Stück (00098878), 6 Stück (01279369)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# KINDERLAX<sup>®</sup> elektrolytfrei

Macrogol 4000

Die geschmacks-  
neutrale Lösung  
bei Verstopfung



## Besonders geeignet:

- Für Kinder mit chronischer Obstipation
- Bei mangelnder geschmacklicher Akzeptanz anderer oraler Macrogol-Präparate

## Wichtig für die Beratung:

- Effektiver als Lactulose<sup>22</sup>
- Elektrolytfrei - neutraler Geschmack
- Kann in Wasser oder andere Flüssigkeiten, wie z.B. Säfte eingerührt werden
- Lokale Wirkung - Macrogol wird nicht resorbiert

 Lösung	<b>Aussehen</b>	weißes Pulver, nach Zubereitung klare Lösung
	<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre; die trinkfertige Lösung kann max. 24h im Kühlschrank (2-8°C) aufbewahrt werden
	<b>Alter</b>	ab 6 Monate bis 12 Jahre
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	nicht relevant
	<b>Dosierung</b>	Anfangsdosis 6 Monate bis 1 Jahr: 1 Beutel; 1 bis 4 Jahre: 1 bis 2 Beutel; 4 bis 8 Jahre: 2 bis 4 Beutel; 8 bis 12 Jahre: 3 bis 8 Beutel
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	30 Stück (11952181), 3x30 Stück (11952703)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig von 6 Monaten bis 11 Jahre

# GLUCOSETEST oGTT

## InfectoPharm

Glucose 25 g /100 ml

Diabetes sicher und  
einfach diagnostizieren



Besonders geeignet:


- Zur Diagnose oder zum Ausschluss eines Diabetes mellitus oder einer gestörten Glucosetoleranz

Wichtig für die Beratung:

- Gebrauchsfertige Lösung – weder Schütteln, noch Verdünnen notwendig
- Frei von Farb- und Aromastoffen
- 2 x 100 ml enthalten 50 g Glucose; 3 x 100 ml enthalten 75 g Glucose

 Lösung	<b>Aussehen</b>	klare, farblose bis höchstens schwach gelbliche Lösung von süßem Geschmack
	<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre; nach Anbruch unverzüglich verbrauchen und Restmengen entsorgen
	<b>Alter</b>	keine Altersbegrenzung
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	ja
	<b>Dosierung</b>	siehe Packungsbeilage
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	2 x 100 ml (18319713), 3 x 100 ml (18319742), 12 x 100 ml (18319765)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre; kann in vielen KV-Bereichen von ärztlichen Praxen als Sprechstundenbedarf verordnet werden

# Die Bakterienflora der Milchgänge



Die Milchgänge in der Brust sind mit einer eigenen Bakterienflora besiedelt. Eine gesunde Bakterienflora sorgt beim Stillen für einen guten und schmerzfreien Milchfluss.<sup>33</sup>

Die natürliche Balance der Bakterienflora in der Brust kann durch Überwucherung schädlicher Keime aus dem Gleichgewicht geraten. So können wunde Brustwarzen beispielsweise eine Eintrittspforte für Bakterien (z. B. Staphylokokken) darstellen.

*Lactobacillus fermentum* CECT 5716 (LC40) unterstützt von innen die gesunde Bakterienflora.

-  gesunde Keime
-  Staphylokokken
-  Milchfluss
-  *Lactobacillus fermentum* CECT 5716 (LC40)

# MamBiotic®

*Lactobacillus fermentum* CECT 5716

Für eine entspannte  
Stillzeit



Besonders geeignet:

- Für Stillende
- Für eine ausgewogene Milchgangflora

Wichtig für die Beratung:

- Enthält probiotische Keime aus der Muttermilch
- Wirksamkeit von *L. fermentum* in klinischen Studien nachgewiesen<sup>25</sup>
- Einfacher Verzehr – einmal täglich eine Kapsel
- Nicht zusammen mit Antibiotika einnehmen, bei Fieber Arzt zu Rate ziehen

 Kapseln	<b>Aussehen</b>	weiße Kapsel
	<b>Haltbarkeit</b>	siehe aufgedrucktes Mindesthaltbarkeitsdatum
	<b>Alter</b>	für Stillende
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	keine Einschränkung
	<b>Dosierung</b>	1 x täglich eine Kapsel zu einer Mahlzeit
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	21 Kapseln (12648338)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	nicht erstattungsfähig

# MamBiotic® Brustwarzensalbe

Lactobacillus-Lysat und natürliche Öle

Pflegt und schützt  
empfindliche Brustwarzen



## Besonders geeignet:

- Zur Pflege beanspruchter Brustwarzen während der Stillzeit
- Zur Unterstützung des Hautmikrobioms und Stärkung der Hautbarriere

## Wichtig für die Beratung:

- Mehrmals täglich nach dem Stillen auf die Brustwarze auftragen
- Ohne Lanolin, tierische Inhaltsstoffe und Farb-/Duftstoffe
- Natürliche Öle zur Pflege empfindlicher Brustwarzen
- Lactobacillus-Lysat (= inaktivierte Milchsäurebakterien) zur Unterstützung des Hautmikrobioms

 Salbe	<b>Aussehen</b>	weißlich-trübe Salbe
	<b>Haltbarkeit</b>	siehe aufgedrucktes Mindesthaltbarkeitsdatum
	<b>Alter</b>	für Stillende
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	keine Einschränkung
	<b>Dosierung</b>	mehrmals täglich nach dem Stillen auf den Brustwarzenbereich auftragen
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	15 ml (18657545)

# Dimet<sup>®</sup> 20

Dimeticon und Dodecanol

Mit nur 20 Minuten Einwirkzeit stark gegen Kopfläuse



Besonders geeignet:

- Bei Kopflausbefall

Wichtig für die Beratung:

Physikalisches Wirkprinzip

- Ausreichend für die mehrmalige Anwendung
- Wirksamkeit in randomisierter Studie belegt<sup>24</sup>
- Wirksam auch gegen Nissen

 <b>topische Lösung</b>	<b>Aussehen</b>	klare Lösung
	<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre; nach Anbruch 4 Wochen
	<b>Alter</b>	ab vollendetem 6. Lebensmonat
	<b>Schwangerschaft/Stillzeit</b>	nach Rücksprache mit dem Arzt
	<b>Dosierung</b>	kurze/mittellange Haare ca. 10–25 ml, längeres Haar ca. 25–50 ml
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	100 ml (11125934)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# INFECTOPEDICUL<sup>®</sup> Lösung

Permethrin 0,5 %

Effektiv und sicher  
gegen Kopfläuse



**Besonders geeignet:**

- Bei Kopflausbefall

**Wichtig für die Beratung:**

- Wirkt gegen Läuse und Nissen
- Hohe Wirksamkeit ist in Studien belegt<sup>25-27</sup>
- Auch im Kombipack mit Nissenkamm erhältlich
- Wirkt noch 3 Tage nach der Anwendung

 <b>topische Lösung</b>	<b>Aussehen</b>	klare Lösung
	<b>Haltbarkeit</b>	nach Anbruch 4 Wochen
	<b>Alter</b>	ab vollendetem 2. Lebensmonat (bis 3 Jahre nur unter ärztlicher Aufsicht)
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	im 1. Trimenon vermeiden, im 2. und 3. Trimenon strenge Indikation / 3 Tage Stillpause einlegen
	<b>Dosierung</b>	25 ml bei kurzem Haar, bis 150 ml bei sehr dichtem und langem Haar
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	50 ml (00497182), 100 ml (00679457), 250 ml (01480284)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# MOLEVAC® Suspension

Pyrviniumembonat

Madenwürmer?  
Wir haben was dagegen!



## Besonders geeignet:

- Für Patienten mit Madenwurmbefall
- Bei Therapiebedarf in der Schwangerschaft und Stillzeit<sup>28</sup>
- Wenn der Wunsch nach möglichst einfacher Therapie besteht

## Wichtig für die Beratung:

- Molevac wird praktisch nicht resorbiert
- Seit Jahrzehnten bewährte Wirksamkeit und Verträglichkeit
- Stoppt schnell und einfach das nächtliche Jucken – i. d. R. nur eine Gabe notwendig

Suspension	<b>Aussehen</b>	rote, dickflüssige Suspension
	<b>Haltbarkeit</b>	2 Jahre
Dragees	<b>Alter</b>	ab 1 Jahr
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	kann während der gesamten Schwangerschaft und Stillzeit eingesetzt werden <sup>32</sup>
	<b>Dosierung</b>	einmalig 5 ml (50 mg)/ 10 kg Körpergewicht; ggf. Wiederholung nach 2–4 Wochen
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	Suspension 25 ml (00683507)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# DeVit Tropfen

Vitamin D<sub>3</sub>

Rachitis und  
Vitamin-D<sub>3</sub>-Mangel  
gezielt vorbeugen



## Besonders geeignet:

- Für Säuglinge und Kleinkinder zur Rachitisprophylaxe
- Zur unterstützenden Behandlung von Osteoporose

## Wichtig für die Beratung:

- Einfache und sichere Einnahme durch ölige Tropfen
- Rezeptfrei in der Apotheke erhältlich
- Individuelle und tropfengenaue Dosierung
- 6 Tropfen entsprechen 400 I.E.

 Tropfen	<b>Aussehen</b>	klare, gelbliche, ölige Lösung
	<b>Haltbarkeit</b>	nach Anbruch 3 Monate
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	nach Rücksprache mit dem Arzt
	<b>Dosierung</b>	6 Tropfen entsprechen 400 I.E. (siehe Fachinformation)
	<b>Packungsgröße (PZN)</b>	10 ml (11518941), 3x 10 ml (12426566)
	<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre

# KA-VIT<sup>®</sup> Tropfen

Phytomenadion (Vitamin K<sub>1</sub>)

Die günstigen  
Vitamin-K-Tropfen



## Besonders geeignet

- Als Standard-Prophylaxe gegen Vitamin-K-Mangelblutungen p.p.
- Zur Umsetzung der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
- Tropfgenaue Dosierung: 2 Tropfen KA-Vit entsprechen 2 mg Vitamin K<sub>1</sub>

## Wichtig für die Beratung

- Kostengünstige Prophylaxe
- Weniger Verpackungsmüll
- Einfache Neugeborenenprophylaxe

 <b>Tropfen</b>	<b>Aussehen</b>	klare o. schwach trübe gelbe Emulsion
	<b>Haltbarkeit</b>	18 Monate, nach Anbruch 3 Monate, nicht gekühlt, nicht über 25°C, vor Licht geschützt, im Umkarton aufbewahren
	<b>Alter</b>	ab Geburt
	<b>Schwangerschaft/ Stillzeit</b>	geeignet
	<b>Dosierung</b>	<i>Aktueller "Goldstandard" nach Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE): gilt für gesunde Neugeborene mit Geburtsgewicht &gt; 2.000 g, geboren in der &gt; 34. Schwangerschaftswoche</i> U1: 2 mg Vitamin K = 2 Tropfen KA-Vit U2: 2 mg Vitamin K = 2 Tropfen KA-Vit U3: 2 mg Vitamin K = 2 Tropfen KA-Vit
<b>Erstattungsfähigkeit</b>	erstattungsfähig bis 12 Jahre und >12 Jahre unter spez. Verordnungsbestimmungen	

## Literatur

- 1 Hay, A. D., et al. „Paracetamol and ibuprofen for the treatment of fever in children: the PITCH randomised controlled trial.“ Health technology assessment 13.27 (2009): 1-186.
- 2 Shams H et al., Br J Pharmacol. 1996;117(5):853-8.
- 3 Birring S et al., Pulm Pharmacol Ther. 2019;56:79-85
- 4 Banderali G et al., J Int Med Res. 1995;23(3):175-83.
- 5 Fachinformation Quimbo Tropfen/ Sirup
- 6 Hoppe JE. Miconazol-Mundgel und Nystatin-Suspension für die Mundsoorbehandlung bei Säuglingen. Kinderarzt 1997, 28 (2), 192-197.
- 7 Hoppe JE et al. (1996). Randomized comparison of two nystatin oral gels with miconazole oral gel for treatment of oral thrush in infants. Infection 24 (2), 136-139.
- 8 Koytchev R et al. (1999). Balm mint extract (Lo-701) for topical treatment of recurring Herpes labialis, Phytomedicine; 6(4):225-230.
- 9 Vogt H et al. (1991). Melissenextrakt bei Herpes simplex. Allgemeinarzt 14, 832-841.
- 10 Fachinformation Zugsalbe effect 20 %/-50 %: Pharmakodynamische Eigenschaften, Stand: 02/2016.
- 11 Jansen T et al. (2007). Evaluation of the efficacy and tolerability of 5 % potassium hydroxide solution in the treatment of molluscum contagiosum in childhood. Aktuelle Derm. 33 (6), 210-215.
- 12 Romiti (2006) Unpublished data.
- 13 Romiti R et al. (2000). Evaluation of the effectiveness of 5 % potassium hydroxide for the treatment of molluscum contagiosum. Pediatr Dermatol. 17 (6), 495.
- 14 Ockenfels HM. Therapeutisches Management kutaner und genitaler Warzen. J Dtsch Dermatol Ges. 2016 Sep;14(9):892-900
- 15 Kwok CS, Gibbs S, Bennett C, Holland R, Abbott R. Topical treatments for cutaneous warts. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep12;(9):CD001781 3 14. Fachinformation Verrucid®
- 16 Schneider M. Was hilft am besten bei Kopfgneis. Die Hebamme 2017; 30; 128-131.
- 17 Gloor M. (1992). Wenig waschen und viel cremen. Therapiewoche 42 (23), 1410-1416.
- 18 Hoppe JE (2000). Therapie des Windelsoors. Sozialpädiatrie 22 (11-12), 382-385.
- 19 Abeck D. Häufige Hautkrankheiten in der Allgemeinmedizin: Klinik, Diagnose, Therapie. Springer Verlag Berlin 2010, 1. Auflage, S. 49-51. Consilium-Stellungnahmen 5444 (2005) und 6686 (2009).
- 20 Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. DGPI Handbuch: Infektionen bei Kindern und Jugendlichen. 2018, 7. Auflage, 246-247.

- 21** Guarino A et al. (2014) European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/ European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: update 2014. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 59 (1), 132-152.
- 22** Treepongkaruna, S et al.; *BMC Pediatrics* 2014; 14:153.
- 23** Maldonado-Lobón et al. 2015, *Breastfeeding Medicine*; Lactobacillus fermentum CECT 5716 Reduces Staphylococcus Load in the Breastmilk of Lactating Mothers Suffering Breast Pain: A Randomized Controlled Trial; Arroyo et al. 2010, *Clinical Infectious Diseases*; Treatment of Infectious Mastitis during Lactation: Antibiotics versus Oral Administration of Lactobacilli Isolated from Breast Milk.
- 24** [https://data-storage.live/data/sec/sd-dimet20studie\\_2010.pdf](https://data-storage.live/data/sec/sd-dimet20studie_2010.pdf)
- 25** Hausteil UF et al. (2002). Einmalbehandlung des Kopflaubefalls (Pediculosis capitis) mit 0,5% Permethrin. *Aktuelle Derm.* 28 (11), 406-409.
- 26** Bialek R. (2005). Studie zur Therapie der Pediculosis capitis (Kopflaubefall) mit 0,5% Permethrin. *Kinder- und Jugendarzt* 36 (3), 197-202.
- 27** Burow HM et al. (2010). Kopflaubefall in Deutschland: Korrelation zwischen Häufigkeit des „Resistenz-Gens“ und klinischer Wirksamkeit von 0,5% Permethrin-Lösung. *Kinder- und Jugendarzt* 41 (3), 224-228.
- 28** Schaefer C et al. (2012) *Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit*. Urban & Fischer Verlag München 8. Auflage.

# Pflichtangaben

## Anaesthesuff® Loto

8 g/100 g Suspension zur Anwendung auf der Haut. **Wirkst.:** Lauromacrogol 400. **Zus.:** 100 g Susp. enth. 8 g Lauromacrogol 400. **Sonst. Bestandt.:** Zinkoxid, Talkum, Titandioxid, Methylcellulose, Propylenglycol, Gereinigtes Wasser. **Anw.:** Linderung der Juckempfindung z. B. bei Varizellen (Windpocken) und Gürtelrose. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit. gg. Lauromacrogol 400 od. einen d. sonst. Bestandt., Füllgel in den ersten Lebenswochen. **Warnhinw.:** Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. Anw. bei Babys unter 4 Wochen mit offenen Wunden od. großflächigen Hautverletzungen od. -schäden (wie Verbrennungen) mit Vorsicht. **Nebeuw.:** Überempfindlichkeitsreaktionen wie z. B. Hauttrockenheit, Pruritus, Erytheme, brennendes Gefühl, Hautirritationen, allerg. Kontaktdermatitis od. Urtikaria. **Apothekenpflichtig.** Stand 02/2021. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

## BabyBene® (Kosmetikum).

Zur Schuppeneentfernung auf dem Kopf z. B. bei Milchschorf/Kopfgneis ab der 3. Lebenswoche. **Ingredients:** Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Polyglyceryl-5 Oleate, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Aqua, Tocopherol, Sodium Chloride, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydrogenated Palm Glycolides Citrate. Kontakt mit den Augen vermeiden. **China:** 04/2017. **Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

## BabyIax, 50 %ige Rektallösung.

**Wirkst.:** Glycerol 85 %. **Zus.:** 1 Miniämlister (Recticle) mit 3,6 g Rektallösung enthält 1,8 g Glycerol 85 %. **Sonst. Bestandt.:** Benzalkoniumchlorid (Kons.-mittel), Macrogol 400, Carbomer (Viskosität 29400-39400 mPa·s), Natriummedetat, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anw.:** Symptomat. Behandl. von Darmträgheit u. Stuhlverstopfung bei Säugl. u. Kindern jeden Alters, insb. dann, wenn Nahrungsumstellung od. diätet. Maßn. allein keine Wirkung erzielt haben. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkst. od. einen der sonst. Bestandt., Ileus nicht empfohlen bei unklaren abdominalen Beschwerden. **Warnhinw.:** Benzalkoniumchlorid kann lokale Reizungen hervorrufen. **Nebeuw.:** Irritationen der Rektalschleimhaut bei besond. empfindl. Personen od. bei vorgeschädigter Schleimhaut, verstärkte Darmschleimhautreizung bei Diabetikern mit durchblutungsbedingten trophischen Störungen. Stand: 07/2020. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

## BiGaia Kautabletten mit *L. reuteri* DSM 17938.

Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel. **Zutaten:** Fullstoff somalt, Süßungsmittel Xylit, *Limosilactobacillus reuteri* DSM 17938, Erdbeeraroma, Säuerungsmittel Citronensäure. **Hinweis:** Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Stand: 09/2020. **BiGaia AB, Kungsbroplan 3, 10364 Stockholm, Schweden**

## BiGaia, Tropfen.

Nahrungsergänzungsmittel mit *Limosilactobacillus reuteri* DSM 17938 **Zutaten:** lösäurereiches Sonnenblumenöl, *Limosilactobacillus reuteri* DSM 17938 ("frühere Bezeichnung Lactobacillus), ganz gehärtetes Rapskernöl. **Wichtiger Hinweis:** Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Stand: 04/2021. **Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim.** In Lizenz von BiGaia AB, Kungsbroplan 3, 10364 Stockholm, Schweden.

## BiGaia Vitamin D<sub>3</sub> Tropfen.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D<sub>3</sub> und *Limosilactobacillus reuteri* DSM 17938. **Zutaten:** lösäurereiches Sonnenblumenöl, *Limosilactobacillus reuteri* DSM 17938 ("frühere Bezeichnung Lactobacillus), ganz gehärtetes Rapskernöl, Vitamin D<sub>3</sub> (Cholecalciferol). **Hinweis:** Nehmen Sie ohne ärztlichen Kontakt mit keine anderen Präparate mit Vitamin D zusätzlich ein. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Stand: 05/2023. **Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim.** In Lizenz von BiGaia AB, Kungsbroplan 3, 10364 Stockholm, Schweden.

## Carum Carvi Baby-Kümmelzäpfchen.

**Wirkst.:** Auszug aus Kümmel. **Zus.:** 1 Zäpfchen enth. 100 mg Auszug aus Kümmel (Carum carvi, ethanol. Decoctum Ø (Urtinktur (= D11))). **Sonst. Bestandt.:** Hartfett. **Anw.:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Tritt während der Anwendung des Arzneimittels keine Besserung der Beschwerden ein, ist medizinischer Rat einzuholen. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gg. Wirkstoff od. einen d. sonst. Bestandt. **Apothekenpflichtig.** Stand: 06/2017. **Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

## DeVit Tropfen 2400 I.E./ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung.

**Wirkst.:** Calciciferol. **Zus.:** 1 ml enth. 0,06 mg Calciciferol entspr. 2400 I. E. Vitamin D<sub>3</sub>. **Sonst. Bestandt.:** All- $\alpha$ -D-Tocopherolacetat, Polyglycerol- $\alpha$ -oleat, Raffiniertes Olivenöl, Süßorangenschalenöl. **Anw.:** Vorbeugung gg. Rachitis bei Früh- bzw. Neugeborenen u. Kindern. Unterstützende Behandl. von Osteoporose in Verbind. mit Calcium u. ggf. spezif. Osteoporosismitteln. **Gegenanz.:** Überempf. od. d. Wirkst. od. einen der sonst. Bestandt., Hypercalcaemie u./od. Hypercalcaurie, Nephrolithiasis, schwere Nierenfunktionsstör., Hypervitaminose D, Pseudohypoparathyreoidismus. **Nebeuw.:** Überempfindlichkeitsreakt. wie Angödem o. Larynxödem; Hypercalcaemie, Hypercalcaurie, Verstopf., Flatulenz, Übelk., Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Durchfall; Überempfindlichkeitsreakt. wie Pruritus, Ausschlag, Urtikaria. **Apothekenpflichtig.** Stand: 11/2019. **Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

## Dimeft® 20, Medizinprodukt.

**Zus.:** Dimeticon, Dodocanon, Isopropanol, Parfumöl. **Zweckbestimmung:** Physikalische Behandlung des Kopflausbefalls. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, Kinder vor Vollendung des 6. Lebensmonats. **Nebeuw.:** Hautreizungen, -brennen und -rötungen, Juckreiz, Hautausschläge, Schwellungen der Haut (diese Nebenwirkungen können Ausdruck einer Überempfindlichkeitsreaktion sein), Hauttrockenheit, Schuppenbildung, trockenes Haar. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen: Reizungen, Juckreiz und Rötungen der Augen. **Dosierung:** Zweimalige Anwendung (Tag 1 und Tag 8, 9 oder 10); Anwendung auf trockenem Haar. Einwirkdauer: 20 min. **Apothekenexklusives Medizinprodukt.** Stand: 02/2018. **Hersteller:** HÄLSA Pharma GmbH, Maria-Geoppert-Str. 5, D-23562 Lübeck. **Vertrieb:** Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, D-64646 Heppenheim.

## Glucosestest oGIT InfectoPharm,

27,5 g/100 ml Lösung. **Wirkst.:** Glucose-Monohydrat. **Zus.:** 100 ml Lösung enth. 27,5 g Glucose-Monohydrat, entspr. 25 g Glucose. **Sonst. Bestandt.:** Citronensäure-Monohydrat, Benzoesäure, Glycerol, ger. Wasser. **Anw.:** Zur Diagnose od. zum Ausschluss eines Diabetes mellitus od. einer gestörten Glucosetoleranz. **Gegenanz.:** Überempfindlich. gg. den Wirkst. od. einen der sonst. Bestandteile. Manifestier Diabetes mellitus, fieberhafte Infekte, akute Magen-Darm-Erkrankungen, stark reduzierter Allgemein- und Ernährungszustand. **Warnhinw.:** Benzoesäure kann Gelbsucht b. Neugeborenen (im Alter bis zu 4 Wochen) verstärken. Glycerol kann Kopfschm., Magenverkrümmung u. Durchfall hervorrufen. **Nebeuw.:** Allerg. Reakt., z. B. Hautrötungen; Magen-druck, Übelk.; während des Tests od. später auftretende hypoglykämische Symptome mit einer Verminderung d. Reaktionsfähigkeit. **Apothekenpflichtig.** Stand: 09/2022. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

## Ibuprofen Pädia 75/150 mg Zäpfchen.

**Wirkst.:** Ibuprofen. **Zus.:** 1 Zäpfchen enth. 75/150 mg Ibuprofen. **Sonst. Bestandt.:** Hartfett. **Anw.:** Kurzzeitige symptomat. Behandl. von leichten bis mäßig starken Schmerzen u. Fieber. **Gegenanz.:** Bekannte Überempfindlich. gg. den Wirkst. od. einen der sonst. Bestandt. des Arzneimittels; bekannte Reakt. von Bronchospasmus, Asthma, Rhinitis, Urtikaria od. Angioödem nach der Einnahme v. Acetylsalicylsäure od. anderen nicht-steroidalen Entzündungshemmern in der Vergangenheit; ungeklärte Blutbildungsstör., bestehende od. in der Vergangenheit wiederholt aufgetretene pept. Ulzera od. Hämorrhagien (mind. 2 unterschiedl. Episoden nachgewiesener Ulzeration od. Blutung); gastrointestinale Blutungen od. Perforation in der Anamnese im Zusammenhang mit einer vorherigen Therapie mit nicht-steroidalen Antirheumatika/Antiplagistika (NSAR); zerebrovaskuläre od. andere aktive Blutungen; schwere Leber- od. Nierenfunktionsstör.; schwere Herzinsuffizienz (NYHA-Klasse III); schwere Dehydratation; Schwangerschaft, im letzten Drittel. **Wirkstärke 75 mg:** Kdr. unter 7,5 kg (8 M.). **Wirkstärke 150 mg:** Kdr. unter 15 kg (3 J.). **Warnhinw.:** Bei Schmerzen od. Fieber ohne ärztl. Rat nicht länger anwenden als in d. Packungsbeilage vorgegeben! **Nebeuw.:** Palpitationen, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt; Störungen d. Blutbildung (Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie, Panzytopenie, Agranulozytose); zentralnervöse Störungen wie Kopfschm., Schwindel, Schläfrigkeit, Erregung, Reizbar. od. Müdigk.; Schläfrigkeit, Tinnitus; gastrointestinale Beschwerden wie Sodbrennen, Bauchschmerzen, Übelk., Erbrechen, Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Diarrhoe, Verstopfung u. geringfügige Magen-Darm-Blutverluste mit und ohne Anämie, gastrointestinale Ulzera mit Blutung u. Durchbruch (manchmal tödlich), Teerstuhl, Hämatemesie, Ulzerative Stomatitis, Verstärkung einer Colitis u. eines Morbus Crohn, Gastritis, Ösophagitis, Pankreatitis; Lokale Reizerscheinungen, blutige Schleimabsonderungen, od. schmerzhaft Defäkation, Ausbildung u. Ödem, insbes. b. Pat. mit arterieller Hypertonie od. Niereninsuffizienz; Neptroph-Syndrom; interstielle Nephritis mit akuter Niereninsuffizienz, Nierengewebsschädigungen (Papillennekrose), erhöhte Harnsäurekonzentration im Blut; bullöse Hautreakt. wie Stevens-Johnson-Syndrom u. toxische epidermale Nekrolyse (Tyeil-Syndrom). **Alopecie:** Arzneimittelanhen mit Eosinophilie u. System. Symptomen (DRESS), akute generalisierte exanthematische Pustulose (AGEP), Lichtempfindlichkeitsreakt., schwere Hautinfekt. u. Weichteilkomplikationen während einer Varizelleninfektion; nekrotisierende Fasciitis, aseptische Meningitis; arterielle Hypertonie, Myokardinfarkt od. Schlaganfall; Überempfindlichkeitsreakt. mit Hautausschlag u. Hautjucken sowie Asthmaanfällen (ggf. mit Blutdruckabfall), schwere allgemeine Überempfindlichkeitsreakt.; Leberfunktionsstörungen, Leberschäden, Leberversagen, akute Hepatitis; psychotische Reakt., Depression. **Apothekenpflichtig.** Stand: 06/2022. **Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**InfectoDell®**, Medizinprodukt.

**Zus.:** 1 ml Lsg. enth. 50 mg Kaliumhydroxid. **Sonst. Bestandt.:** Gereinigtes Wasser. **Anw.:** Äußerlich b. Befall mit Dellwarzen (Molluscum contagiosum). **Gegenanz:** Nicht anw. in Augennähe, auf bereits entzündeten Dellwarzen, auf Schleimhäuten, offenen Wunden oder aufgekratzter Haut; zur Behandlung v. gewöhnlichen Warzen, Alterswarzen, Muttermalen sowie Hühneraugen u. id. Hautveränderungen; bei Säuglingen u. Kleinkindern unter 2 J. bei Neigung zu überschießender Narbenbildung (hypertrophe Narben, Keloiden); bei Immunschwäche. **Warnhinw.:** Die Lsg. ist stark ätzend; Bei Fellwund; sind Verätzungen möglich! Für Kinder unzugänglich aufbewahren u. bei d. Anw. außerhalb d. Reichweite v. Kindern halten. Nicht einnehmen! Kontakt m. Kleidung vermeiden. **Nebenw.:** Kurzzeit. Hautreizungen, vor allem Rötung u. leichtes Brennen, vorübergeh. Entzündungsreakt. mit Rötung u. Juckreiz, Schwellung, Verschönerung d. abtrocknenden Hautpartie, vorübergeh. Hypo- bzw. Hyperpigmentierung, Narbenbildung, Ekzeme od. Hautausschläge im Bereich d. Dellwarzen od. d. anderen Stellen (Folge d. Abwehrreakt. gg. Molluscum-Viren). **Apothekenexklusives Medizinprodukt.** Stand: 02/2018. **Hersteller:** HÄLSA Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 5, D-23562 Lübeck. **Vertrieb:** InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, D-64646 Heppenheim

**InfectoDiarrstop LGG.**

**Zus.:** 300 mg Bifidobacterium InfectoDiarrstop LGG mit 4,65 g Pulver enth. 25 mg Lactobacillus rhamnosus GG, gefriergetr., entspr. mind.  $5 \times 10^9$  koloniebild. Einh., 840 mg Natriumcitrat (Ph. Eur.), 300 mg Kaliumchlorid, 200 mg Natriumchlorid, 20 mg Glucose-Monohydrat (Ph. Eur.), 1281 mg D-Glucose. **Sonst. Bestandt.:** Sacrose, Aspartam, Maltodextrin, Natriumascorbat. **Anw.:** Therapie d. Diarrhö b. Säugl. u. Klein. **Gegenanz:** Überempf. gg. einen d. Wirkst. od. einen d. sonst. Bestandt.; Niereneinsuff., unstillb. Erbrechen, Bewusst.-trübung bzw. Schock b. schwerer Dehydratation od. metabol. Alkalose; einige Flüssigk.-mangelzust., z. B. b. akutem Darmverschluss. **Warnhinw.:** Enth. Aspartam (9 mg pro Doppelkammerbeutel) als Quelle f. Phenylalanin, kann schäd. sein b. Phenylketonurie. Zur Beurteilung d. Anw. von Aspartam bei Säugl. unter 12 Wochen liegen weder präklinische noch klinische Daten vor. Enth. Glucose u. Sacrose. Pat. mit d. seltenen hereditären Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption od. Saccharase-Isomaltase-Mangel sollten InfectoDiarrstop LGG nicht einnehmen. 1 Doppelkammerbeutel enth. ca. 3,1 g verwerbt. Kohlenhydr. Wegen des hohen Glucosegehalts sollte InfectoDiarrstop LGG von Diabetikern nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eingenommen werden. 1 Doppelkammerbeutel enth.: 4,02 mmol (od. 157,2 mg) Kalium (zu berücksicht. b. eingeschr. Nierenfunkt. sowie kontroll. Kalium-Diät) u. 276 mg Natrium, entsprechend 14 % der von der WHO für einen Erw. empfohlenen max. tägl. Natriumaufnahme mit der Nahrung von 2 g. **Nebenw.:** Kalium-bd. Magenreiz. m. Übelk. u. Erbr.; Bakteriämien u. Sepsis durch Lactobacillus rhamnosus GG bei Pat. m. bestimmten Risikofaktoren (s. unter Warnhinw.). Organe wie Herz od. Lunge können beteiligt sein; Überempf.-reakt. u. Urtikaria. **Apothekenpflichtig.** Stand: 03/2023. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**InfectoGingi® Mundgel,**

10 mg/120 mg/120 mg pro 1 g. Gel zur Anwendung in der Mundhöhle. **Zus.:** 1 g Gel enth.: 10 mg Lidocain, 120 mg Auszug aus Salbeiblättern (1-1,95 – 2,2) Auszugsmittel Ethanol 66,3 % (V/V), 120 mg Auszug aus Kamillenblüten (1-1,9 – 2,2) Auszugsmittel Ethanol 66,3 % (V/V), Minzol, Propylynglykol, Kaliumcarbonat, Kieselgel (Natrium 1430), Hydroxyethylcellulose, Chlorophyllin-Kupfer-Komplex-Triaminosalicylat, ger. Wasser. **Anw.:** zeitweilige unterstütz. Beh. von Entzündungen u. Wunden der Mundschleimhaut u. der Zahnhäutchen. **Gegenanz:** Überempf. gg. die Wirkst., Minzol, Korbbilblätler od. einen der sonst. Bestandteile. **Warnhinw.:** Propylynglykol kann Hautreiz. verursachen. Anw. mit Vorsicht bei Babys unter 4 W, insbes., wenn das Baby gleichz. andere Arzneim. erhält. die Propylynglykol od. Alkohol enthalten. **Nebenw.:** Überempf.-Reakt. wie z. B. Brennen, Schwellungen, Rötungen, Juckreiz, nesselartige Hautausschlag (Urtikaria), Hautentzündung (Kontaktdermatitis), Hautausschlag od. Schmerzen mögl.; Geschmacksveränd., Gefühlslosigkeit; schw. allerg. Sofortreakt. (anaphylakt. Reakt. u. Schockreakt.). Bei entsprechend sensibilisierten Pat. können durch Minzol Überempf.-Reakt. (einschließl. Atemnot) ausgelöst werden. **Apothekenpflichtig.** Stand 08/2023. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**InfectoPedicul, Lösung 430 mg/100 ml, InfectoPedicul + Nissenkamm,**

Lösung 430 mg/100 ml. **Wirkst.:** Permethrin. **Zus.:** 1 Flasche mit 86,0 g (100 ml) Lösung enth. 430,0 mg Permethrin 25:75. **Sonst. Bestandt.:** Ethanol 96%, 2-Propanol (Ph. Eur.), Propylynglykol, Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat, ger. Wasser. Enth. ca. 39 Vol.-% Ethanol (Alkohol). **Anw.:** Zur Behandlung v. Kopflausbefall bei Erw. u. Kdm. nach dem vollendeten 2. Lebensmonat. **Gegenanz:** Überempfindlich gg. Permethrin od. andere Wirkstoffe aus der Pyrethrin-Gruppe. **Warnhinw.:** Kontakt mit Augen, Schleim, oder offenen Wunden vermeiden. Brennbar. Hautreiz. durch Propylynglykol mögl. Empfehl.: bei Anw. Einweghandschuhe tragen. Bei Überempfindlichkeit ggü. Chrysanthemem o. a. Kobaltblättern nur bei strenger Indikation stellen. Nur begrenzte Erfahrungen bei Kdm im Alter von 2 Monaten bis 3 Jahren (Behandl. nur unter engmaschiger ärztl. Aufsicht). **Nebenw.:** Kopfschm., Parästhes., Schwindel; Atembeschw.; Übelk., Erbrechen; Hautirritat. (Rötung), Pruritus, Prickeln, Brennen, Stechen, allerg. Hautreakt., Kontaktdermatitis, Urtikaria, Haarausfall, Schuppenbildung. **Apothekenpflichtig.** Stand: 05/2021. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**InfectoSor Mundgel.**

**Wirkst.:** Miconazol. **Zus.:** 1 g enth. 20 mg Miconazol. **Sonst. Bestandt.:** Polysorbat 20, Saccharin-Natrium, vorverkleisterte Stärke (aus Kartoffeln), Orangen- und Kakao-Aroma (enth. D-Limonen, Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol, Benzylalkohol und (E)-Benzylcinnamat), Ethanol 96 %, Glycerol, gereinigtes Wasser. **Anw.:** Hefepilzinfektion der Mundschleimhaut (Mundsoor) b. Säugl. ab 4 Monaten, Kdr. u. Erw. **Gegenanz:** Überempfindlich gg. Miconazol, andere Imidazol-Derivate, D-Limonen, Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol, Benzylalkohol u. (E)-Benzylcinnamat od. einen d. sonst. Bestandt.; Leberfunktionsstörung; Säugl. unter 4 Mon., Kdr. mit nicht vollst. ausgeb. Schluckreflex; gleichz. Anw. v. AM, die ebenfalls über Cytochrom-P450-3A4 in d. Leber metabolisiert werden: Wirkstoffe, die das QT-Intervall verlängern können; z. B. Astemizol, Bepridil, Cisaprid, Dofetilid, Halofantrin, Mizoalasin, Pimozid, Chindin, Cytindin, Terfenadin; Mutterkorn-Alkaloide; HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren; z. B. Simvastatin, Lovastatin; Triazolam u. orale Darreichungsformen v. Midazolam; gleichz. Anw. v. AM, die ebenfalls über Cytochrom-P450-2C9 in d. Leber metabolisiert werden: orale Antikoagulantien, z. B. Warfarin. **Warnhinw.:** Enth. Ethanol. Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen. Enth. Aromastoffe mit D-Limonen, Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol, Benzylalkohol u. (E)-Benzylcinnamat. Diese Bestandt. können allerg. Reakt. hervorrufen. **Nebenw.:** allerg. Reakt. einsch. anaphylakt. Reakt., Geschmacksstörr., Aspiration, Mundtrockenheit, Übelk., unangenehm. Gefühl im Mund, Erbr., Regurgitation, Diarrhöe, Stomatitis, Zungenverfärb.; Hepatitis, Angiodödem, Iyell-Syndrom (toch. epiderm. Nekrolyse), Stevens-Johnson-Syndrom, Urtik., Arzneimittelexanthem, Arzneimittelexanthem m. Eosinophilie u. system. Manifestationen, akute general. exanthematöse Pustulose; abw. Produktgeschmack. **Apothekenpflichtig.** Stand: 05/2021. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**InfectoSoor Zinksalbe.**

**Zus.:** 1 g enth. 2,5 mg Miconazolnatrium u. 150 mg Zinkoxid. **Sonst. Bestandt.:** Weißes Vaseline, Glyceroltris(12-hydroxyoctadecanoat). **Anw.:** Behandl. v. Dermatitisen d. Haut u. Hautfalten, die durch Candida spp. superinf. sind. **Gegenanz:** Überempfindlich gg. Miconazolnatrium, andere Imidazol-Derivate, Zinkoxid od. einen d. sonst. Bestandt. **Nebenw.:** allerg. Reakt. einsch. angioneur. Ödem u. anaphylakt. Reakt.; Irritat. d. Haut, Urtik., Kontaktdermatitis, Exanthem, Erythem, Pruritus, Hautbrennen, Despigmentierung, Reak. u. Irritationen an der Applikationsstelle einsch. Warmerempf. **Apothekenpflichtig.** Stand: 01/2019. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**KA-VIT® Tropfen, 20 mg/ml Emulsion zum Einnehmen.**

**Wirkst.:** Phytomenadion (Vitamin K1). **Zus.:** 1 ml (20 Tropfen) enthält 20 mg Phytomenadion. **Sonst. Bestandt.:** Natriumacetat, Polysorbat 80, Sorbinsäure, gereinigtes Wasser. **Anw.:** Therapie von Vitamin K Mangelzust.; Prävention von Vitamin K-Mangelzust., die ernährungsmaßig nicht behoben werden können. **Gegenanz:** Überempf. gg. Phytomenadion oder einen der sonstigen Bestandt. Bei auf Cumarinide eingestellten Pat. ist die Gefahr einer Thrombose zu bedenken, weil die gerinnungsförm. Fakt. schneller durch Phytomenadion aktiviert werden als die gerinnungshemm. **Warnhinw.:** Enth. weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 1 ml (20 Tropfen), d. h. sie sind nahezu „natriumfrei“. **Nebenw.:** Sehr selten allergische Reakt. **Apothekenpflichtig.** Stand 10/2020. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**Kinderlax elektrolytfrei.**

**Zus.:** 1 Btl. enth. 4 g Macrogol 4000. **Anw.:** Abführmittel z. symptomat. Behandl. v. Verstopf. b. Kdr. v. 6 Monaten bis 12 Jahren. **Gegenanz:** Überempfindlich gg. Macrogol, Bauchschmerzen unklarer Ursache (Verdacht auf) Darmverschluss; (Gefahr eines) Darmdurchbruchs; schw. entzünd. Darmerkrank. wie Morbus Crohn u. Colitis ulcerosa; tox. Megacolon. **Warnhinw.:** Wenn Flüssigkeiten angedickt werden müssen, damit das Kind sie sicher schlucken kann, beachten Sie bitte, dass Kinderlax elektrolytfrei dem Verdickungseffekt entgegenwirken kann. **Nebenw.:** Vollegefühl, blähungen, vermehrte Darmgeräusche, Bauchschmerzen, Verdauungsstörr. (Dyspepsie), Beschwerden im Analbereich, Übelk., Erbr., Durchfall; Überempfindlich-reakt. (Hautausschlag, Juckreiz, Schwellung d. Gesichts od. ernstere (anaphylakt.) Reakt. mit Frühzeichen wie Unruhe, Atemnot schluck- u. Sprechproblemen, Übelk. od. Schwindel). **Apothekenexklusives Medizinprodukt.** Stand: 07/2022. **Hersteller:** Fairpharm Vertriebs GmbH, Am Krebsenbach 5-7, 83670 Bad Heilbrunn. **Vertrieb:** InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim

**Kochsalz 0,9 % Inhalat Pädia,**

Medizinprodukt. **Zus.:** Isotonische Natriumchloridlösung (0,9 %). **Sonst. Bestandt.:** Keine. **Zweckbest.:** Zur Nasenreinigung und Befeuchtung der Nasenschleimhaut sowie zur Befeuchtung der oberen u. unteren Atemwege durch Inhalation mittels eines elektrischen Verneblers. Als begleitende Maßnahme bei der Behandlung von Erkältungskrankheiten. Zur Befeuchtung der Atemwege nach langem Aufenthalt in Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit. Zur Verdünnung von Arzneimitteln zur Inhalation. **Apothekenexklusives Medizinprodukt.** Stand: 02/2019. **Hersteller:** Penta Arzneimittel GmbH, Werksstraße 3, D-92551 Stulln. **Vertrieb:** Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, D-64646 Heppenheim.

**IGG® Kapseln.**

Nahrungsergänzungsmittel mit gefriergetrockneten lebenden Bakterien von *Lactobacillus rhamnosus* GG. **Zutaten:** Füllstoff Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, *Lactobacillus rhamnosus* GG, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Farbstoff Calciumcarbonat. **Hinweise:** Nicht geeignet für Personen mit einem stark gestörten Immunsystem. Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet! Kann Spuren von Milch enthalten. Stand: 08/2023. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim, Deutschland**

**LomaHerPan Lippenpflegecreme bei Lippenherpes mit Melissenextrakt (Kosmetikum).**

Zur Pflege und zum Schutz von herpesgestreuten Lippen bei Kindern ab 3 Jahren und bei Erwachsenen. **Ingredients:** Aqua, Petrolatum, Glycol Stearate SE, Potassium Stearate, Melissa Officialis Leaf Extract, Benzyl Alcohol, Ceteareth-20, Tocopherol. **Stand:** 08/2020. **InfectoPharm Arzneimittel, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim, Deutschland.**

**LomaProtect, Lippenpflegefestif mit Melissenextrakt.**

**Ingredients:** Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Brassica Campestris Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Cera, Candelilla Cera, Hydrogenated Soybean Oil, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Diethylene Glycol Monoethyl Ether, Methylhexylbenzoyl Methane, Methylhexyl Butanoid Triazone, Tocopheryl Acetate, Methyl, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Melissa Officialis Leaf Extract, Ascorbyl Palmitate, Ethyl Vanillin, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Laminaria Ochroleuca Extract, Tocopherol. **Stand:** 11/2021. **InfectoPharm, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**MamBiotic®.**

Nahrungsergänzungsmittel für Stillende mit *Lactobacillus fermentum* CECT 5716. **Zutaten:** Maltodextrin, Hydroxypropylmethylcellulose, *Lactobacillus fermentum* CECT 5716 (L140), Stabilisator Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. Kann Spuren von Milch enthalten. **Wichtige Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. **Stand:** 09/2022. Biosearch S.A.U., Camino de Purchil 66, 18004 Granada, Spanien.

**MamBiotic® Brustwarzenalbe mit Lactobacillus-lysate (Kosmetikum).**

**Ingredients:** Helianthus Annuus, Seed Oil, Hydrogenated Rapeseed Oil, Lactobacillus Ferment Lysate, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopherol. **Stand:** 04/2023. Lactopia GmbH, An der Rönnerbrücke 16, D-66121 Saarbrücken

**Molevac Suspension.**

**Wirkst.:** Pyruvium. **Zus.:** 5 ml Susp. enth. 75,25 mg Pyruviummonbonat (entspr. 50 mg Pyruvium-Base). **Sonst. Bestand.:** Benzoesäure, Kirscharoma (enth. Benzylalkohol), Methylcellulose, Natriumhydroxid, Natriumphosphat, Poloxamer 188, Propylenglycol, Saccharin-Natrium, Sucrose, Salzsäure, Sorbitanmonolaurat (Ph. Eur.), ger. Wasser. **Anw.:** Infektionen durch Enterobius vermicularis (Oxyuriasis) bei Kindern ab 1 J., Jugendlichen und Erwachsenen. **Gegenanz.:** Überempf. og. Pyruviummonbonat, Benzylalkohol od. sonst. Bestand., Leberschädig., entzündl. Darmerkrank., Nierensuffiz. **Warnhinw.:** Molevac larbt den Stuhl hellrot; Pat. mit d. seltenen hereditären Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption od. Sucrose-Isomaltase-Mangel sollten Molevac nicht einnehmen, 5 ml Susp. enth. 1,15 g Sucrose (Zucker), dies ist b. Pat. mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen; enth. Benzoesäure u. Benzylalkohol, die gleichz. Anw. mit einem Substrat d. Alkoholdehydrogenase (z.B. Ethanol) kann schwerwiegende Nebenwirkungen bei Kdr. unter 5 J. hervorufen; die Anw. von Propylenglycol bei schwangenen und stillenden Pat. sollte im Einzelfall abgewogen werden, bei Pat. mit eingeschränkter Nieren- od. Leberfunktion ist eine med. Überwachung erforderlich. **Nebenwirk.:** Bauchschm., Übelk., Erbrechen, Kopfschmerzen, Durchfall, Magenkrämpfe, Blähungen, Verstopf., Krämpfe; Schwindel, Larynxödem; Stomatitis; allerg. Hauterschein. mit u. ohne Juckreiz z.B. Urtikaria, Urticaria, Rötung, Purpura, Angioödem; Benzylalkohol kann allerg. Reakt. hervorufen. **Apothekenpflichtig.** **Stand:** 12/2022. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim.**

**Neuroderm® Basispflege (Kosmetika).**

Für die tägliche Basispflege der trockenen Haut, z. B. bei Neurodermitis, zur Stärkung der Hautschutzbarriere und Erhöhung der Hautfeuchtigkeit. **Ingredients: Neuroderm Pflegecreme:** Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Polyglyceryl-3-Dioleatate, Isopropyl Palmitate, Polyethylene, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Citrate, Citric Acid, Tocopherol. **Neuroderm Pflegecreme Lipz:** Aqua, Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Dicaprylyl Ether, Caprylic/Capric Triglyceride, Cera Alba, Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3-Dioleatate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Zinc Stearate, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Sodium Citrate, Citric Acid. **Neuroderm PflegeLotion:** Aqua, Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Dicaprylyl Ether, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, Persea Grattissima Oil, Polyglyceryl-3-Dioleatate, Zinc Stearate, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, PEG-8, Sodium Citrate, Citric Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid.

**Neuroderm® Repair Intensivcreme (Kosmetikum).**

Unterstützt die Regeneration der Haut und stabilisiert die Hautschutzbarriere. **Ingredients:** Aqua, Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Caprylic/Capric Triglyceride, Persea Grattissima Oil, Cera Alba, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3-Dioleatate, Alcohol, Zinc Stearate, Ceramide NP, Geramide NP, Hydrogenated Lecithin, Cholesterol, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, PEG-8, Sodium Citrate, Citric Acid, Oleic Acid, Palmitic Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, EDTA, Sodium Ascorbate, Ascorbic Acid. **Stand:** 02/2018. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim, Deutschland.**

**Neuroderm Mandelölbald.**

**Zus.:** 1 g enth. 300 mg Mandelöl u. 693 mg dünnflüssiges Paraffin. **Sonst. Bestand.:** Dimeticon 20, Macroglycerylhydroxystearat (Ph. Eur.), Gesamttocopherole (Antioxidantien), Parfümöl. **Anw.:** Unterstützt. Behandl. von Dermatosen mit trockener, juckender Haut wie z. B. atopisches Ekzem, Psoriasis, Ichthyosis, Pruritus senilis, Windeleczem, Wascheckem. **Medizin. Baderzusatz** zur äußerl. Anwendung. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. og. einen der Inhaltsstoffe, Psoriasis pustulosa. **Warnhinw.:** Sollte nicht in die Augen gelangen. **Macroglycerylhydroxystearat (Ph. Eur.)** kann Hautreize hervorrufen. **Nebenw.:** Allergische Kontaktdermatitis, Urtikaria. **Apothekenpflichtig.** **Stand:** 07/2023. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**Quimbo® Sirup/ Tropfen.**

**Wirkst.:** Levodropropizin. **Zus.:** 10 ml Sirup/ Lösung enth. 60/ 600 mg Levodropropizin. **Sonst. Bestand.:** Sirup: Saccharose, Citronensäure-Monohydrat, Natriumhydroxid, Kirscharoma, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) 13 mg, Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) 2 mg, ger. Wasser; Tropfen: Propylenglycol, Xylitol, Saccharin Natrium, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) 15 mg, Aromastoffe, Citronensäure, ger. Wasser. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. og. den Wirkstoff, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat (Sirup) od. einen der sonst. Bestand. sowie bei produktivem Husten (Husten mit Auswurf), vermind. mukoziliärer Funktion (Kartagener-Syndrom, Ziliendyskinesie), stark eingeschränkter Leberfunktion, Kdrn. unter 2 J., Schwangere u. Stillende. **Warnhinw.:** Strenge Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses b. Pat. mit schwerer Niereninsuffizienz. Bei älteren Pat. vorsichtig zu dosieren. **Quimbo Sirup/Tropfen** enth. weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis von 10 ml (Sirup)/20 Tropfen, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“. Enth. Methyl-4-hydroxybenzoat, welches Überempfindlichkeitsreakt., auch Spätreakt., hervorufen kann. **Sirup:** 10 ml Sirup enth. 4,0 g Saccharose, entspr. ca. 0,3 BE. Dies ist bei Pat. mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen. **Pat. mit** seltenen hereditären Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption od. Saccharose-Isomaltase-Mangel sollten Quimbo Sirup nicht einnehmen. Enth. Propyl-4-hydroxybenzoat, welches Überempfindlichkeitsreakt., auch Spätreakt., hervorufen kann. **Tropfen:** Enth. Propylenglycol. **Nebenw.:** Nesselsucht (Urticaria), Hautrötungen (Erytheme), Hautausschläge (Exantheme), Jucken, Schwellungen (Angio-ödem), Hautreakt.; Magen-Darm-Beschwerden, Übelk., Erbrechen, Durchfall; Schwindel, Zittern, Missempfindungen, Schwäche, Mattigk., Schläfrigk., Bewusstseinsentwürbungen, Benommenh., Kopfschmerzen; Herzklöpfen, beschleunigter Herzrhythmus, erniedrigter Blutdruck; Atemnot, Husten, Schwellungen im Atemwegsreich; Schwäche, Schwäche in Unterschenkeln; allerg. u. Überempfindlichk.-reaktionen. **Apothekenpflichtig.** **Stand:** 02/2022. **Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**SanaCutan® Basiscreme/Basisalbe.**

**Zus.:** Weißes Vaseline, dickflüssiges Paraffin. **Basiscreme:** Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Macroglycerylstearylether (Ph. Eur.) (20), Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Phosphorsäure 85 %, Kaliumstearat (Ph. Eur.), Sorbinsäure (Ph. Eur.), Glycerol 85 %, ger. Wasser. **Anw.:** **Basiscreme:** Im Rahmen einer Intervallbehandl. b. Hauterkrank., die mit kortikoidhalt. Salben od. Cremes beh. werden, z. B. Ekzeme u. Dermatitis; besonders zur Beh. akuten nässender Hauterkrank. **Basisalbe:** Im Rahmen einer Intervallbehandl. b. Hauterkrank., die mit kortikoidhalt. Salben od. Cremes beh. werden, z. B. Ekzeme, Dermatitis; u. Psoriasis; besonders zur Beh. chron. verlaufender Hautprozesse bei trockener Haut. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gegen einen der Bestand., Anw. auf Schleimhäuten od. am Auge. **Warnhinw. (nur Basiscreme):** Cetylstearylalkohol, Kaliumstearat u. Sorbinsäure können örtl. begrenzte Hautreiz. (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. **Nebenw.:** Hautreakt., Pruritus, Exanthem, Erythem, Hautausschuppung, Brennen, Überempfindlichk., Schmerzen, Hauttrockenheit, bullöse Dermatitis. **Apothekenpflichtig.** **Stand:** 07/2023. **Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**Tapfi 25 mg/25 mg wirkstoffhaltiges Pflaster.**

**Zus.:** 1 wirkstoffhaltiges Pflaster von 10 cm<sup>2</sup> enth. 1 g Emulsion mit 25 mg Lidocain und 25 mg Prilocain. **Sonst. Bestandt.:** Emulsion: Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph.Eur.), Carbomer 974P, Natriumhydroxid, ger. Wasser; in Kontakt mit d. Haut stehender Teil d. wirkstoffhaltigen Pflasters: saugfähige Cellulosescheibe, beschichtete Trägerfolie (Aluminiumfolie mit Kunststoffüberzug), Schaumstoffklebestreifen (Polyethylen-beschichteter Ring mit Acrylatkleber). **Anw.:** Zur Oberflächenanästhesie von intakter Haut im Zusammenhang mit: der Einführung von Nadeln, z. B. von intravenösen Kathetern od. bei Blutentnahmen; chirurgischen Eingriffen an d. Hautoberfläche; bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gegen Lidocain u./od. Prilocain od. Lokalanästhetika vom Amidtyp od. einem der sonst. Bestandteile. **Warnhinw.:** Enth. Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph.Eur.), das Hautreakt. hervorrufen kann. **Nebenw.:** Methämoglobinämie; Hypersensibilität; Irritation d. Hornhaut; Purpurale u. petechiale Läsionen (besonders nach längerer Einwirkdauer bei Kindern mit atopischer Dermatitis od. Molluscum contagiosum/Dellwarzen); Erythem/Ödem/Blässe am Anwendungsort, Brennen, Juckreiz/Wärmegefühl am Anwendungsort. **Apothekenpflichtig.** Stand: 09/2020. **Pädia GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**Verrucid® 10 % Lösung**

**Wirkst.:** Salicylsäure. **Zus.:** 1 g Lösung enth. 0,1 g Salicylsäure. **Sonst. Bestandt.:** Essigsäure 99 %, Docusat-Natrium, Rizinusöl, Pyroxylin, Ethanol 96 %, Aceton, Isobutylacetat. **Anw.:** Äußerl. als Schälmittel bei Hyperkeratosen: Warzen, Hühneraugen (Clavus) u. Hornschwiele (Kallus). **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gg. Salicylsäure, Salicylate od. andere Bestandt. des Arzneimittels. Keine Anw. bei Säugl. u. Pat. mit Niereninsuffizienz. Darf nicht mit Schleimhäuten in Berührung kommen, insbes. ist ein Kontakt mit den Augen zu vermeiden. **Warnhinw.:** Vorsicht beim Auftragen in der Nähe von Entzünd. u. Wunden. Darf nicht im Gesichts- od. Genitalbereich verwendet werden. Zur Vermeid. einer Infektionsausbreitung sollte das eigene Handtuch nie zur Mitbenutzung an Andere weitergegeben werden. Bei bestehenden Fußwarzen soll nicht barfuß gegangen werden. **Nebenw.:** Nach dem Auftragen kann es gelegentl. zu lokaler Reizung (meistens leichtes Brennen) u. sehr selten zu Kontaktallergie kommen. Teleangiectasien, braune Flecken, Photosensibilisierung, Dermatitis, Verdünnung der Epidermis und Pigmentstörungen. **Apothekenpflichtig.** Stand: 01/2021. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

**Zugsalbe effect 20 %/50 %.**

**Wirkst.:** Ammoniumbituminosulfonat. **Zus.:** 100 g Salbe enth. 20 g/ 50 g Ammoniumbituminosulfonat. **Sonst. Bestandt.:** Weißes Vaseline, Wollwachsalkohole [können Butylhydroxytoluol (Ph. Eur.) enth.], Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anw.:** Topisches Antiphlogistikum zur Reifung v. Furunkeln u. abszedierend, einschmelz. Prozessen. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gg. Ammoniumbituminosulfonat u. andere sulfonierte Schieferölprodukte od. einen d. sonst. Bestandt.; Schwangerschaft, Stillzeit. **Warnhinw.:** Wollwachs u. Cetylstearylalkohol können örtl. begrenzte Hautreaktionen/Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Butylhydroxytoluol kann örtl. begrenzt Hauteizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen. **Nebenw.:** Reiz. d. Haut, Jucken, Brennen, Rötung, bei hoher konz. Präp. leichte Irritat., Kontaktallergie. **Apothekenpflichtig.** Stand: 01/2021. **InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim**

# Patienten-Ratgeber

## Unsere Patienten-Ratgeber


- Leicht verständlich geschriebenes Wissen zu den unterschiedlichsten Erkrankungen und Themenbereichen
- Praktische Tipps für den täglichen Umgang mit häufigen Beschwerden
- Von erfahrenen Ärzten überprüft
- Wir haben auch einige fremdsprachige Ratgeber im Angebot, u.a. in Englisch, Türkisch, Russisch, Französisch, Arabisch, Persisch

All unsere informativen Ratgeber finden Sie online unter [www.infectopharm.com/ratgeber](http://www.infectopharm.com/ratgeber) oder ganz einfach durch Abscannen des QR-Codes

A8002032\_03



# Kursbuch für die Schwangerschaft Geschwisterpass mit Urkunde, Babypass und Meilensteinkarten








Themenhefte

**NEU**



**Gewichtsentwicklung bei Neugeborenen**  
(Thomas Kühn)



**Mastitis, Milchstau und Mamma-Abszess**  
(E. Hertel, A. Renning)



**Vom Wert der Muttermilch und des Stillens**  
(Manuela Burkhardt, Nicole Rohnert)



**Funktionelle Stillprobleme des Säuglings - eine osteopathische Sichtweise**  
(Annette Schwalbenhofer)



**Der übermäßig schreiende Säugling**  
(Prof. F. Petermann, Dr. S. Buderus)



**Säuglingsernährung**  
(Dr. Axel Enninger)



**Windeldermatitis**  
(Dr. A. Höger)




**Neurodermitis bei Kindern**  
(Dr. med. Lars Lange)



**Hyperbilirubinämie**  
(Dr. Stephan Illing)



**Beratung in der Stillzeit**  
(Dr. M. Ude, M. Burkhardt)



**Alkohol in der Schwangerschaft**  
(Dr. med. Marcus Riemer)



**Fetale Alkoholspektrumstörungen (FASD)**  
(Dr. Heike Hoff-Emden)



**Wenn Männer schwanger sind**  
(Nils Hilliges)



**Vater werden - Vater sein**  
(Nils Hilliges)



Bestellen Sie Ihr gewünschtes Material einfach per E-Mail an: [kontakt@paedia.de](mailto:kontakt@paedia.de)

# Notizen

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

# Notizen

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Mehr Informationen  
unter [www.paedia.de](http://www.paedia.de)



InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH · Pädia GmbH  
Von-Humboldt-Straße 1 · 64646 Heppenheim · [www.infectopharm.com](http://www.infectopharm.com) · [www.paedia.de](http://www.paedia.de)  
[kontakt@infectopharm.com](mailto:kontakt@infectopharm.com) · [kontakt@paedia.de](mailto:kontakt@paedia.de)

Kostenfreie Hotline:  0800 000 5840